

萬氏秘傳片玉心書

萬氏秘傳片玉心書卷之四

羅田醫蘇萬全著

公孫通之萬達刻

上海圖書館藏

胎毒門

凡小兒在月內有病者皆胎毒也併治其母

小兒月內腸胃甚脆氣血未充若有微疾不可妄施

補瀉恐臟腑一傷將胎患終身或致夭命矣可不

成哉如不得已而用湯丸毋伐天和病即止又

不可過劑也乳母服藥必別擇乳母而後宜補可

泄也若養母自乳又不可亂投湯藥蓋產后之婦  
氣血甚虛有補無泄苟兒有熱病而用涼藥則犯  
產后之禁必害其母如有溫補則反加小兒之熱  
又害其子醫者人之司命而可妄為乎必須斟酌  
謹慎勿損陰德 生兒之母謂之曰尊

凡小兒綿生即死者急看兒口中懸癰脰上必有泡  
塞住即以手指搗破其泡連以軟綿拭血令淨若  
血入咽即死

凡小兒初生氣絕不能啼者必因難產或因胃寒所

致急以綿絮重裹其兒抱于懷中不可便斷脐帶  
却把胞衣置鍋中向炭火上煮之又作油炷點着  
于脐帶上性未燥之頃更熱氣由脐入腹便能喘  
方可洗浴斷帶若不知此急救之而先斷帶者多  
死不活

凡小兒初生下被寒風所吹鼻塞服藥不得有用天  
南星為末生薑自然汁調成膏貼額門上自愈  
凡小兒生后或月內或兩日氣急喘滿目閉眼赤睛  
多神困呵吹遍身壯熱小便赤澁大便不通時從

驚煩此胎熱也因母平日嗜食辛甘熱物食服後藥而致用涼驚丸黃連解毒湯治之

### 黃連解毒湯

黃連 甘草 木通 生地 連翹 薄荷 少許

川芎 陳皮 灯心 三棱 水煎服

小兒生後竟口冷腹熱腸滑泄瀉作，多眠或在多啼此胎寒也因母喜啗生冷或外感多服涼藥致傷胎氣理中丸白氣散治之

### 白氣散

桔梗 陳皮各二分 砂仁五分 茴香一分 生薑炮二分  
 粉草一分 加木香二分 共為細末每服一字春  
 湯調下

凡小兒生下浮胖通身紅色滿月以後漸瘦弱互  
 心煩熱此名胎肥又有生下面無晶光身无血魚  
 目无精彩肌肉消削此名胎怯並內服八物湯外  
 用沐浴法

八物湯

當歸 川芎 生地 白芍 人參 白朮

卷之六

七

甘草 白朮 姜棗引水煎服

沐浴法

天麻 蝎稍 硃砂各五分 白丸 青黛 射香各

烏稍蛇肉酒浸燒為末 各三錢 共研為細末 每用三錢水

三碗 桃枝連葉一握 同煎十沸待 溫熱沐之 慎勿

沐背

凡小兒生下遍身面目皆黃狀如金色 身上壯熱大

便不通 小便如枝子汁 乳食不思 皆胎黃也 因乳

母受熱而傳于胎用

地黃湯

生地

赤芍

大花粉

赤茯苓

川芎

當歸

緒苓

澤泄

木通

甘草

茵陳

水煎溫服

凡小兒生後壯熱跳眼握拳咬牙身腰強直涎潮嘔吐搐掣驚啼腮縮顛開或頰赤而青眼合更胎風眼合不可候作慢脾風妄用湯藥要視其眉間氣色若紅赤鮮碧者可治若黧黑青黑者不治虎口指紋曲入裏者可治出外者不治此因妊婦調食平常飲酒嗜肉忿怒驚撲母有所触胎必感之或

外挾風邪有傷于胎故子乘母氣生下即病以至

聖保命丹金銀灯心湯下

至聖保命丹 治小兒驚內癩腹肚堅硬睡不安夜

多啼哭急慢驚風眼目上視手足搐掣不省人

事者服之即効

全蝎

十四个 防风

二身 白附子

一兩 星

泡用牛

蝉退

去毒 僵蚕

炒去毒 天麻

二 辰砂

一 射香

五

右為末揉糯米飯丸如黃豆大金丹為衣每一丸

鈞藤灯心湯磨下有熱加牛黃腦子明砂又方加

老活二子此藥常服鎮心化痰

袖珍方云胎驚治法宜解散風邪利驚化痰調氣貼  
額甚則以朱銀九利之面青拳搐者且服保命丹  
釣藤散全蝎散初生嬰兒難以用藥凡有此候急  
取猪乳細研辰砂牛黃射香各少許調抹入口中  
即愈矣

全蝎散 治胎驚癇諸驚

全蝎一个 琥珀 辰砂各少許 交冬湯調下一字

独活湯 治胎驚癇散風邪

羌活 独活 各二 兵郎 天麻 麻黄 去 耳草 各一

右劉散每服一不白才煎內加天南末蜜調貼額

門上

凡小兒生下大便三五日不通者此名鎖肚胎中受熱毒壅盛結于肛門閉而不通死後滋潤急令婦人以溫水漱口吸咽兒前后心併臍下手足共七處凡四五次再用麩粉五分蜜少許溫水化開時少許服之以通為度如更不通即是肛門內合或如余管透以通之須判八二寸以香油和密

納入孔中糞出為快也若胎服不乳呻吟聲至千  
七日難可望生矣

凡小兒生即不吮乳此由拭口不淨穢物入腹致令  
腹滿氣短不能吮乳或有嘔吐乳不得下或胎中  
受寒令兒腹痛不乳此則多啼以

木香散治之

木香 甘草 茯苓 干姜 木瓜 丁香

陳皮 各等分共為細末每用一字水煎綿蘸酒  
與食之

臍風者由斷臍之后被木濕風冷之氣所乘流入心  
脾令腹脹臍腫四肢強直日夜多啼不能吮乳甚  
則癸為風搖動臍邊青暈撮口不開若是為內搐  
不治必用藥者死

撮口者由胎氣挾熱毒風邪入臍滲入心脾二經故  
令舌強唇青口撮喘急啼聲不出不乳若口出白  
沫四肢冷者不治最為急候一臘之內尤甚  
崇風者眼閉口撮啼聲漸少吮乳不待口吐白沫大  
小便皆不通亦由胎中受熱毒流入心脾故形

于喉舌間也

以上三症其名雖異受病則一初生七日之內得此症者多死若不急救坐以待斃良可憫焉

但兒小兒噴嚏多啼身熱不乳急看兒上腭有小泡子如果米大或以指甲或以皂耳耪刮去以綿線纏指蘸溫水拭淨其血勿令下咽即便安妥不必服藥誠良方也

凡小兒牙關緊急已成撮口驚搐者急用撮風散以開其關次用控痰散以吐其痰然后用益脾散和

胃保命丹祛驚即愈若手足李拳口噤不開者不  
治

撮風散

金脚蜈蚣黃毒 全蝎五個 直僵蚕炒去嘴

射香許少 共為末每用一字以猪乳和之滴入口

中即開

控痰散

蝎尾 銅青各五 硃砂一分 膩粉一分 射香許少

共為末每服一字 嚼茶清化下吐出風痰

益脾散

白茯苓 草果煨 木香 甘草 陳皮 厚朴炙

蘇子 各等分為細末每服五分姜枣煎湯細

服之

亦有熱在胸堂伸縮死時呃作聲弩脹其氣以致  
臍突浮腫此非斷臍使之然也但散其血愈加破  
龍胆湯主之

胆草 前胡 黃芩 防風 桑白皮 糖梗

赤芍 枳殼 甘草 大黃煨 水煎服得下便止

亦有肚脹青筋吊腸外疝內氣引痛而撮口者皆腸  
胃鬱結不通致之治法貴乎疎利紫霜丸量而與  
之一粒金丹尤妙

### 紫霜丸

代赭石

七 醋

赤石

脂

各一

杏仁

五十粒 去皮尖

巴豆

三十粒 去壳心

先將杏仁巴豆研

如泥

入二石和勻慢蒸餅丸

如粟米大百日者三丸周歲者五丸看兒肥怯加

減微利為度

凡疝中出汗不乾者

用龍骨

五黃栢

各一粘丸

二分

為

未敷之

酉江月

小兒初生病症許多名狀皆同胎驚撮口與脐風寒  
熱肌瘦黃腫嘔吐昏不乳脐間血水溶未曾  
滿月病多凶好以風中燭弄

衆是脐風可畏三朝八日為殃初然噴涕似風傷啼  
哭時之囁囁急看口中上脘刮除白泡中央展開  
惡血細端詳莫使下咽為上

若是不知此法致令泡落兒吞忽然腹脹滿膨之脐

腫青筋雜亂撮口昏工不乳目眩又紫牙關啼声  
不出命喘天勸取衣棺平斂

胎黃狀如金色身熱大便燥通小便黃赤色朦朧少  
乳時工舌弄此症傳來无膏脾胃濕熱相攻涼驚  
涼血解重工保養胎元蒸用

外有胎肥胎瘦此為稟賦虛盈父精母血必多虧兒  
子不充元氣此個甚難調理愚夫不曉支持一朝  
有病致傾危却把命來救可

上時工吐奶不思乳食昏沉此由穢物下咽門拭

洗未能潔淨會喉中間阻隔太倉上口雷凝熱痰  
順氣藥通神炮製生姜作引

生下忽然腹脹胎中血水淋漓斷臍將息失調宜各  
水邪風侵入外用灰丸粘貼連令乾較為奇若遷  
縱口哭声稀縱有灵丹莫治

小兒生下數日瞳中帝哭多驚此因母氣失和平常  
因七情為病以致胎胞氣逆痰涎流入脾心治須  
順氣更清神鎮墜痰涎始定

胎熱過身如火發斑丹毒風瘡神昏目痛又驚羣大

小便難哭噪此是母食煎炒溫經煖藥幸方急瀆  
解毒令清涼耳草黃連為上

胎寒生來吐泄大便清濇多清腰中疼痛哭聲頻而  
色青黃不定平日母喜生冷寒邪傳入胞姓治宜  
丸散用其溫可保嬰兒性命

要識小兒治法方為得業專門半週一歲病何因胎  
毒單工見症自後飲食漸瘦肥耳之變瀆明此時  
脾胃病多尋消食養脾法定

胎病要行涼解无如其草黃連若加脾筋病相參參

木陳皮有驗巴豆牽牛丁桂砒硫白汞青鉛俱傷  
正氣損其元悞了孩兒命短

### 變蒸門

變蒸者此小兒正病也蓋變者異也每變異性情即  
異于前何者長生臟腑之意也蒸者蒸也然蒸也  
萬物生于春而長于夏者以陽主生長將于人亦  
然故變蒸足始及成人氣血充實骨肉堅牢也小  
兒此症譬如蚕之有眠能之脫骨虎之轉爪而變  
化同也故每三十二日有變蒸至五百七十六日

大小便蒸足矣輕則發熱微汗其狀似驚重則壯  
熱脈亂而數或汗或煩而哭燥渴輕者五日解其  
候與傷寒相似亦有變蒸之餘感寒邪者但變蒸  
則耳冷上唇發泡如濁珠若寒邪傳之則寒熱交  
爭而腹痛啼哭之聲且夜不絕治此之法輕者不  
須服藥重者以平和飲子微表之甚甚便結以紫  
霜丸微利之若吐泄不乳多啼者調氣散治之

平和飲子

人參

五分

白朮

去皮

甘草

五分

升麻

五分

煨

粟

受

勝者加

白朮紅肥實者不用 水煎服

調氣散

木香 香附 厚朴 炙 人參 陳皮 藿香

炙草 姜棗水煎

凡小兒初生有用黃連甘草以下胎藥者若見吐乳者藥胎足固无所損者藥胎怯弱者受此寒涼之劑不生異症者鮮矣

如有裏症轉結壅閉不通者飲下胎毒只用淡豆豉濃煎湯與之五七口其毒自下又能助養脾胃真

奇方也

凡小兒當變蒸之時不熱不驚別生他症是為暗變  
一此受胎氣壯實故也

凡小兒初生多有灸百會者取其可以截風也殊不知地南北人有勇怯北人用灸固宜南人用之无益而有害也

凡小兒初生下有身破裂者必死阴囊白者必死阴不起者必死无粪門者必死既問无肉者必死哭如<sup>鴨</sup>聲者必死周歲之間願骨間解齒未生手足挛

縮膝如雀節身體瘦弱長大不能行立者此皆胎  
氣不足者也多天者筋實則多力骨實則行早血  
實則形瘦多髮肉實則少病精實則伶俐多語笑  
不怕寒暑氣實則少髮而體肥此皆受稟胎氣之  
有餘也多壽

西江月

小兒變蒸何以三十二日為期精神改變異常時發  
熱蒸、昏睡或遇風寒外感或蒸乳食傷脾疳積  
皆楚莫差池好把湯丸調治

大抵六十四日初生腎與膀胱并半心火與小腸肝  
胆第三長養肺與大腸右四脾胃五次消詳三焦  
胞絡不同鄉只為有名老狀

小兒發生智慧自然發熱如兼昏不乳欠醒  
似蚕眠相應醫者不須妄治父母何必憂驚三日  
之后自和平只怕別生疳症

若遇風寒外感慳子散子堪行內傷乳食不安寧保  
和養脾蒸進咳粒參蘇飲下吐泄理中景靈驚來  
臨掣用瀉青導赤亦宜選進

驚風門

驚自是驚風自是風要分別頭面不可混治

凡小兒因聞非常之聲見異類之物或為爭鬪推跌或大小禽獸之類致驚其神氣結于心而痰生焉痰壅氣逆遂成搐搦口服至卯口吐涎沫一時即醒如常无事或一日一發或間日再發或三五日一發或半年一發一年一發若不急治變成癩痰而為終身之痼病也治法當先利痰順氣后用清心安神

凡者或因外感風寒或內傷飲食以致熱生痰以壅

發搐口眼歪邪手足牽動氣喘涎潮口吐涎沫發  
過畧醒潮熱不退溲更復發治法當先泄火開痰  
後用安神清熱

驚風有二有急有慢急驚風為實為熱當涼驚泄火  
慢驚風為虛為寒當用溫補不可一例混治以致  
殺人

急驚風小兒无氣素安或因恐怖或因風或因飲食  
而發要審明白詳察症候而施治法

或因因恐怖而成驚者其症發過即如常凡他症先

以利痰九順氣開痰後用安神九調之

如曾因風寒而成者其症發過畧醒更復發者  
只用導赤散吞下瀉青九以清心肝之火後以抱  
龍九治痰保命丹除風緩調之

如曾因傷飲食而成者其症發過畧醒多啼哭瀉  
更復發不思乳食先用陳皮麥芽湯吞下五色九  
推去食積則痰自降後用辰砂五苓散治之

凡治急驚風除飲食一症外不可遽用下藥必先問  
其大小便何如若小便清大便通利其邪在表只

用導赤散加防風或泄青丸加大黃加全蝎作湯服之去表中之寒邪其風自退後以辰砂五苓散調之不可犯射香恐引邪入裏若小便赤澀大便秘結此邪在裏可用五色丸下之後用抱龍丸保命丹調之

凡急驚發時牙關緊閉不醒者急用艾炷灸兩手大指頭少商穴合而灸之在甲旁即醒而後施治法凡急驚風痰氣喘急者用定喘湯加竹瀝治之痰涎湧塞不聞者可用此法

凡病退後潮熱不退者此脾虛熱也四君子湯加炒  
乾姜以治之若小便赤大便硬兩腮紅足脛熱者  
此餘邪未盡不可作虛看用涼驚丸薄荷打心煎  
湯吞下調之

凡病退後睡眠不醒者此心脾二經之邪熱未去  
也安神丸治之

凡小兒但有潮熱觀其兩頰若赤目上視者必作驚  
風也當先以導赤散加灯心薄荷以去其熱次用  
抱龍丸以安其神則風自不作矣

利痰丸

南星 牛胆者 枳壳 麸炒 陳皮 去白 大黃 二

牽牛頭末 二 共為末 皂角熬水為丸 灯心湯吞

下

安神丸

黃連 去老 石菖蒲 二 遠志 去心 歸身 二 麥冬 去心

茯苓 二 山枝子 二 共為末 煉蜜為丸

導赤散

生地 木通 甘草 加竹葉七皮水煎服

五色丸

黃芩仁二 大黃仁二 黃連仁二 共為末分作五分煎水  
為丸一分青黛為衣名青九子一分硃砂為衣名  
紅九子一分輕粉為衣名白九子一分皂角燒灰  
存性研末為衣名黑九子一分雄黃為衣名黃九  
子

瀉青丸

歸身 川芎 大黃煨 羌活 防風 梭子仁  
胆草 各等分為末煉蜜為丸如梧桐子大竹葉

湯下 此瀉肝火之藥也如發熱去 大黃 加

全蠍 姜蚕 炒竹葉引水煎服

辰砂五苓散

朱苓 澤泄 赤茯苓 白朮 官桂 一灯心引水

煎調辰砂末服之

定喘湯

陳皮去白 南星 製枝子仁 軟石膏 杏仁泥

薄荷葉 赤茯苓 右剉水煎入竹瀝服之

吐法 用土牛膝根取自然汁灌入口中其涎自吐

灸法 先以兩手六指相合于甲側縫中處燒三壯

又以兩手中指相合于甲側縫中心燒一二壯即醒者可治不加痛者不治

祖傳治驚風先以雄黃解毒丸刮去痰熱後用涼驚

丸退火再用保命丹安神丸調之

發急驚風之時手撮目閉口張顛顛口氣促急吐沫噴藥昏睡不語不啼口禁絕不飲食遺尿失屎面赤如硃此皆不治之症

凡慢驚風小兒胎稟素弱又多痰病或大吐大瀉或

久瘧痢悞服吐下之藥皆致精神虛耗漸成搐搦  
十无一全如元神虛弱又逢恐怖而成慢驚者其  
症發過即如常但多啼哭睡中不寧不可妄用利  
痰之藥先以青州白丸子加青礞石以去其痰次  
服安神丸以四君子湯送下如因吐瀉大病之後  
手足逆冷昏睡目睛微露而无搐掣者此欲成慢  
驚症也急溫補之四君子湯加熟附子一片愈后  
以集聖丸調之

凡吐泄大病之後已成慢驚風者其症口目牽引手

足膝掣以醒脾散驅風醒脾風退以參苓白朮散  
為丸服之

凡慢驚風痰氣壅塞者不可妄用通利之藥只以青  
洲白丸子加青礬石治之

凡慢驚風不醒不暈者灸百會三里男左女右乳下  
凡慢驚風已退或有餘熱不喜飲食先服四君子湯  
一二劑后以集聖丸調之

青州白丸子

半夏 炮 川烏 各去皮尖 南星 各去 白附子 各五 共為末

以絹袋盛之用水攤平為度放磁器內日晒夜露  
 一日一換其水換水必撓數轉候如玉片丹研細  
 不用青礞石一另研細以煅硝五同石末入  
 銅鍋內煨通紅硝不為度全冷入上藥和勻以糯  
 米粉打糊為丸以薄荷湯入蜜調送下其痰自墜

調元湯

黃芪八人參五甘草二白芍五水煎服內經  
 云熱淫乎內以耳泄之以酸收之此之謂也

聖解散

人參

全蝎

白附子

天麻

升草

白茯苓

木香

白朮

石菖蒲

蓮肉

水

一中姜枣煎

煎服有熱去木香

凡治驚風不可妄用辛香寒涼之藥蓋辛香能竅元

氣寒涼反傷脾胃也

凡小兒夜啼哭目睛上視日間畧定者此內釣也蓋

因受寒氣腹中作痛以至痛極日定以灯心燒灰

調滾水化下理中丸痛止病退

如小兒日夜啼哭目覩物不轉身後仰者此外釣也

五食積作痛其身強直而目亦定以灶心土泡滾  
水送下下香脾積丸病退痛止

如小兒忽然氣急涎响口眼如常手足不搐身无熱  
者此乍感風寒肺經受邪也用芎藭散一服即退  
如小兒腹脹喘滿胸膈氣急兩肋扇動隔下作坑兩  
鼻竅張闊吐咳嗽作渴声啞涎壅壅塞大小便閉  
此馬脾風也若不急救或不識症死在旦夕宜先  
用牛黃奪命散下之後用白虎湯平之

如小兒兩手輪指目界直視此白虎症也但身不熱

手足不掣宜向年白虎方取土池湯吞蘇合香丸  
如小兒口吐黃白沫面色變易喘急腹脹痛及側掣搥  
其狀似驚但眼不上窺此由精神虛弱外感寒氣  
卒暴觸忤名客忤耳先視其口中上脘左右有小  
腫胞急摘破之更以蘇合香丸姜湯化下外以降  
香皂角二味燒薰次用淡豆豉三合水浸濕搗爛  
為丸如雞子大摩兒顛上及兩足心各五六遍次  
摩臍心良久拍開有毛即擲之  
如小兒久咳腹脹作喘胸高氣逆目睛上視手足牽

引此名龜胸熱症也。但身无熱，以葶藶丸治之。見方  
嗽以上之症，俱與驚相似，不可一例施治。候者恐  
傷其命。

### 考蝎散

川芎 葶藶 各一  
蝎稍小 細辛 半  
蔓 湯酒浸七次  
焙乾 共為末，煎湯調服，或薄荷湯化下亦可。  
牛黃奪命散

白牽牛 黑丑 各半  
生半 熟一  
東頭五卜 大黃 枳壳 各一

共為末，冷漿水調下，涎多者加蜜少許。

如小兒痘疹驚搐者只用導赤散調服砂末一服不  
可妄用涼驚抱龍保命等藥

西江月

小兒驚風症候須分急慢根由急因實熱泄中求慢  
是虛寒溫補急為風寒食積慢是久病調繆如斯  
辨認不差謬藥顯神功妙手  
急驚卒然大熱因而熱則生風痰涎哽塞角張弓口  
眼歪邪沉重先使嚏驚妙散後用導赤疏通合灸  
少商與中冲瀉青涼驚選用

君過風寒外感先須發汗為宜瀉青丸子作湯臣加  
上蠟蚕二味果是內傷飲食又當解利相隨三黃  
五色任施為積去熱除驚止

慢驚先因久病精神漸減脾虛慳三沉困氣長吁口

眼張開不乳搐搦時三奔發四肢逆冷何如理中

附子急驅除不瘥艾灸左乳即期門穴也小兒乳

要認驚風痲症而如紅粉塗搽口涎涎出緊閉牙目

直氣粗声啞喉內响似拽鋸毛端汗如珠了目睛

眼小不須誇大叫闕亂尤怕

搐掣乍作乍止痰涎死了无休養，  
鼾睡喚難甦乳食不知吞吐  
屎尿遺時少氣四肢僵直乳收啼聲  
不出汗如油喉乾丹難收

小兒驚風咳嗽人工當僕風哮喘  
大黃白果二牽牛人參分兩勻用  
四味俱研為末蜜水調和稀稠灌將  
一字下咽喉免得胡針亂灸

兩指伸縮名為搐

十指開合搐之形

掣則連身常跳起

顛而四體動搖

身即向後為反症

手如挽弓引狀成

怒目靦高是穢操

睛露赤活最斯真

嘔吐門

声物俱有曰嘔无声有物曰吐有声无物曰乾嘔其  
症有三有寒有热有食积

寒吐者吐时少而出物多此胃食寒也以理中丸治  
之或用胃苓丸以暖姜汤送下寒吐食不化恶食  
热吐者吐时多而出物少此胃有热也以二陈汤加  
黄连煨姜治之热吐食化不恶食

食积吐者要分三集明白俱恶食如食即吐者此积

在上集胃口也宜用瀝蘆湯吞一小中後以鴉翎  
毛掃喉中令有吐尽則積后以二陳湯加乾薑煨  
神曲炒麥芽炒砂仁治之如食在之時而吐者此  
積在中集下口過小腸上口處也先以丁香脾積  
丸通去旧積后以二陳湯加消導藥治之如早食  
晚吐晚食早吐者此積在下集小腸下口過大腸  
上口處也先以丁香脾積丸下之后以二陳湯加  
消導藥治之消導藥 神曲麥芽炒砂仁香附子  
之類

如嘔吐久而諸藥不納者此胃中火熾火熾則格之病用

理中湯以薑棗猪胆汁同炒煎服即愈

如嘔吐酸重者以理中丸加烏梅一個附子一小片

黃柏川椒一服即愈

凡嘔吐后瘦弱者只以集毒丸調之

理中湯 此藥性熱所以治寒

人參 甘草 芍藥 白朮 水一中煎服

若為丸煉蜜臨時為丸滾水送下

如嘔吐不納藥者此明盛拒陽也必加重便猪胆汁

者取查便味酸酸性寒胆汁味苦性寒以和理中  
湯服則阴体漸消阳性乃發故内經曰伏其所主  
先其所因之謂也

二陳湯 此藥性平寒熱通用

陳皮 半夏次 白茯苓 甘草 水一中盞

姜三片引嘔 吐加白木 煨乾姜此二味嘔吐

必用之藥也 換熱而吐者加 煨乾姜炒黃連

凡傷食加 神曲炒麥芽砂仁香附子山查 此

五味消導必用之藥

祖傳治嘔吐只用胃苓丸煨乾薑湯吞治之不問寒  
熱凡吐不止服藥無效加蠟悶者不治吐不止日  
上竄頭后仰者不治

西江月

嘔吐病原不一治者要辨由嘔則聲物一時有  
物無聲曰吐更有無聲無物此名噦而乾嘔又當  
辨症藥分法有甚難為措手

冷吐乳食不化腹脹喘急先時面白眼慢氣多汗吐  
有夾食清水此因風寒入胃或食生冷傷脾抑傷

宿乳胃中虛不納乳食吐

熱吐有紅面赤乳食入而難消吐物黃色遍身燒大  
熱渴多煩燥此因暑氣在胃或食熱物蒸熱胃氣  
因熱不和調氣運運既吐了

積吐如何分曉眼胞浮而微黃足冷脘熱異尋常登  
鞋夜重寃瘴宿冷滯在脾胃故吐黃酸水漿或吐  
酸醜氣味有此傷宿食形狀

小兒傷乳吐者形症更要消詳乳緣哺后吐浪瀉或  
少停而吐止此因乳食无度脾氣弱不能當運將

空乳令兒背乳節吐止為上

吐症既分明白治法能貴精微冷吐理中湯最宜熱吐五苓去桂續吐九轉靈應下后枳朮調之傷乳而吐葉方奇三續散子為最

嘔吐乳食不納任是湯藥難帶此謂閉盛格孤陽時醫都无主張參朮煨姜熱附島梅壹便尤良猪胆同入煨消詳此法應如影响

吐嘔燥藥不納我有絕勝奇方煨吐散子妙非常半夏官桂二揀生姜独宜多取并兼少用為良依方

製造水煎嘗仍用生姜為上

一苛蛔虫吐此為蛔多厥陰烏梅丸子効如神一  
服蛔安吐定又有咳而吐者化癥順氣須明如營  
嘔吐與胃苓湯用生姜作引

嘔吐不止之症分明說與匠人如服正藥俱无灵更  
加煩燥乱悶嘔吐只是不止目睛上竄頭危頭往  
上仰魄如飛正好安排后事

再附惡心一症有痰有熱有虛三症生姜通用之藥  
宜隨症區處若是胃中有熱二陳加上苓連姜汁

炒過共同煎各用一錢最驗

泄瀉門

泄瀉皆屬于濕其症有五治法分利并提為主

如泄瀉青白或不思食不化腹痛四肢冷而飢白作  
渴者此寒濕也其症多得于冬以五苓散作引  
吞化理中丸即止如寒甚不止者理中湯加附子  
一片即効

如泄瀉注成黃水者或渴或不渴此風濕也其症多  
得于春五苓散加防風羌活蒼木治之

如泄瀉清水腹中无痛者此純濕也以胃苓湯治之  
如泄瀉腸滑不止者此濕傷元氣下陷也宜升提之  
四君子湯加升麻防風烏梅治之或用四君子湯  
吞下七味肉豆蔻丸

如泄瀉酸臭腹痛面黃帶熱不喜飲食者此食積也  
先以丁香脾積丸推去其積后以導聖丸調之  
如泄瀉日久目无神氣口唇張四肢冷好腫者以四  
君子湯調之多服有効甚者加熱附子一片煨姜  
服之

知泄瀉日久身熱不退只以調元湯治之此虛熱也

不可妄用寒涼之藥甚者加乾薑即効

凡久泄後人事黃弱者以集聖丸調之

五苓散 入膀胱腎經

朱苓去皮澤泄 白朮 赤茯苓 官桂 此分利

開胃之藥也水一中煎服

理中丸

人參 白朮 甘草 乾姜 加砂仁 藿香

烏梅 附子 朱砂 澤泄

玉露散

此藥性寒所以治熱

寒水石

滑石

各一斤草五

共為末每服一錢

冷水調下或用此藥煎湯吞理中丸

胃苓湯

蒼朮

厚朴

猪苓

澤瀉

白朮

白茯苓

甘草

陳皮

官桂

四君子湯

此藥性溫可以補元氣之不足

人參

白朮

白茯苓

甘草

水一中盞三片東

二枚溫服

肉豆蔻丸 此藥性溫而滋所以止瀉也

肉寇

五斤

赤石脂

七斤

廣木香

二斤

砂仁

二斤

枯丸

七斤

白龍骨

五斤

柯子肉

五斤

共為末水糊為丸

陳米

送下

白朮散

此治渴之聖藥也

人參

白朮

白朮

木香

藿香葉

甘草

而各

乾葛

二斤

共為粗末每用一二錢姜三片引水煎

服

袖珍方非乾葛乃乾姜也

調元湯

此治虛熱之聖藥也

黃芪

人參

甘草

如後不退加乾姜即效如

身熱手足寒者加熟附一片煎服

祖傳治泄瀉不問寒熱凡川芎各九錢一粒 丹以

車前草同炒米煎湯服之

凡久泄不止精神黃好面赤唇紅者不治

凡久泄不止作渴不休者不治

凡久泄不止脈沉細遍身皮冷不思飲食泄滑不止

者不治

凡久泄不止又或驚搐者不止

凡久泄不止變成赤白痢疾者不治

凡久泄不止大肉消瘦者不治  
凡久泄不止大孔如竹筒不收閉者不治  
凡泄瀉不間輕重只要飲食如常不準他症者不難  
于治而易愈

西江月

泄瀉秘傳治法幸聞不謬時人如今得授與子孫勝  
似良田萬頃初學且行淡滲溫中其次施行三升  
四塞收斂嬰此方古今亦究

泄瀉緣何發作只因水谷無分所以濃滲法先行小

便長而泄定滿石車前赤茯苓白朮猪苓并草  
澤泄與砂仁姜朮煎來作引

淡滲行而又泄瀉防谷氣中虛濕中尤散不瀉拘攣  
要一時泄住白朮入參砂朮姜草依書烏梅  
熟附澤泄猪引用生姜作主

溫中若還不効中氣下陷瀉擬人參白朮與黃芪并  
草乾姜炙取澤泄猪苓依外傳熟附烏梅柴胡  
白芍與當歸引用姜朮休養

以此并擬未止只因腸滑難收塞用通用更何憂

其情婦可救參朮炙姜炙草烏梅粟壳相扶升麻  
柯子為婦求姜朮同煎溫服

淫尿泄逐不止其間吉少凶多假饒父母不奈何要  
你醫時休錯參朮附陳姜朮砂仁豆蔻粟柯乾蟬  
聲茶木香和赤石醋丸服可

泄瀉時常作渴白朮散子如仙人參白朮木香蒸乾  
白朮香葉片并草薢參七味烏梅加上同煎焙時  
再用伏龍肝此法千金不換

泄瀉如常治法不須別用心机只將黑藥胃苓醫三

服自然停息如此不能取效依前四法支持吾將  
心法教人知脾顯明醫三世

五六月間泄瀉其中舉少熱多理中九子救沉痾玉  
露散子真可不勒四苓作引同春理中調和自然  
泄止莫嗟訖活得人多念我

夏月人多泄瀉腹疼煩熱相攻猪苓澤泄茯苓同并  
草乾姜炙用白朮黃連滑石人參砂藿溫中升麻  
提氣妙无劣更把烏梅煎送

泄瀉症雖各别大要摠因濕成風寒水濕中人身乳

食過傷為病此由中氣不足脾胃積滯惟深以致  
氣脈不調勻故成泄瀉之症

人皆知有泄瀉當分泄瀉原根論則滑泄故无声熱  
則腸結為痢故致裏急後重如水注下有聲此名  
瀉症熱緣因下筋條成痼疾

細詳冷泄病症腸中却似雷鳴注下清白水之形而  
白肚疼等症甚者四肢厥逆此由兒瀉寒侵寒氣  
在腹刺攻人故令兒患此症

熱泄色多黃赤小便不利心煩口燥作渴定咽乾食

乳必粗可驗此由腸胃挾熱冷風乘入其間熱氣  
相傳不安然所以見有此患

冷熱不均泄瀉、色赤白不常或水或谷病為殃小  
兒如何抵當此由先冷后熱先熱後冷傷腸胃  
宿虛內中藏冷熱交攻勾當

更有傷食而泄腹脹乳食不思面黃寒熱異常時  
多酸臭氣味此由乳食過度以致脾胃傷虧遂成  
泄瀉病孩提小兒多有此疾

又有一般暑泄多于暑熱之時亦宜寒熱症中推涼

好斟酌用劑若或瀉濇赤白腹大青筋髮稀或  
泥土出蛇時此為痺泄之疾

久見泄多青色亦或發熱有時睡卧不安忽驚悸乃  
是驚泄之勢此是脾受肝剋速宜及早醫之若變  
脾風痙瘓時就是神仙貴力

泄瀉注成黃水或渴不渴殊途此在風濕症中求多  
病春天花時候如或瀉下青水腹中不作痛楚此是  
純濕病之由症傳陰雨之後

泄瀉腸滑不止濕傷元氣陷虛藥宜非參救地龍繞

得医理妙處如或泄瀉日久身熱仍用不除此為  
日久氣多虛調元湯劑宜服

治泄之法瀉水腹无新存此藥因受濕分明四  
卷二末當增飲食不胃不律宿食不化純在此則  
氣虛痛之根參苓并藥為

腹內痛甚則瀉，后痛減免疑此藥合積在中尋神  
曲大黃枳滌一劑一泄此障泄火更見腸鳴大症  
分明用四苓加上參通水勝

大端泄瀉續虛瀉法條貫分明匠人最要細詳論尤

醫方類聚卷之...

五

黃作方对痢痢治只依前法滋菜切薑先行若然  
胡乱敗章稗反变痢腹章症

泄泻不知症候許反不止堪憂精神美好渴无休面

赤唇紅消瘦脾理若見沉細滑泄不乳煩怒变痢

赤白或驚搐大孔如筒不救

辨疾歌

便黃因内熱紅赤蒸同青綠而青皆冷非肥食臭味

久泄四肢痿繞驚睡不安掃疥毛作穗涎嗽定陽寒

肝冷傳脾臭綠青

焦黃脾土熱之形

肺腸寒色膿黏白 赤熱因心腎熱成

身熱發厥歌 久泄多虛熱

氣虛多發厥血虛須作熱氣血若俱虛身熱手足厥  
吐瀉門

吐瀉名曰霍亂其症有三有寒有熱有食積

凡上吐下瀉兩腮紅赤遍身熱口作渴吐瀉時多而  
出物少者此屬于熱用五苓散燥乾姜治之或用  
燥姜湯透冷調服無不神效

凡上吐下瀉而脘白是冷腹痛多啼哭不作瀉吐瀉

時少初出物多者此屬于寒用理中湯治之甚若  
加附子烏梅効此上二症皆不阻乳食

凡吐瀉出物酸臭面黃不喜飲食腹常作痛者此食  
積也以丁香脾胃積先推去其積后以集聖丸調之  
凡吐瀉久身瘦作熱者只用集聖丸治之

祖傳治吐瀉不閉寒熱虛實只用胃蘇丸煨姜湯送  
下即安

益元散 又名六一散又名天水散

滑石

兩六

甘草

兩一

為細末或煎服或冷水調服

凡吐瀉不止作渴不休者不治加驚搐者不治口舌  
生瘡手足冷身熱此陰降陽升脾氣中絕不治

西江月

大凡男女吐瀉明陽順逆當明男逢瀉甚下氣陰女  
子吐多不應出物多而數少此為寒盛相侵如逢  
物少數頻、火盛細加体認

吐泄若是同見此名霍亂明陽只用一劑理中湯上  
吐下瀉了當服此若还不効再加熟附煨薑烏梅  
作引是良方其與俗人誇獎

吐瀉時三作渴諸飲湯藥無效飲水飲湯腹膨三  
手生現死症急用伏龍飲子時與吃調停瀉史  
吐止火邪寧緣與理中對症

吐瀉分為三症食積寒積當知面黃身熱惡乳食此  
疝方為食積若身熱作瀉宜為熱症法除面白  
身寒腹痛時正是虛寒之疾

食積宜行轉取皮應去積物宜如途熱症又何如  
元五苓為主寒症埋中可用甚加附子烏梅寒  
熱用胃香奇香用乾姜煎水

痢疾門

痢疾不問赤白皆屬渾熱或以赤為熱白為寒者非也亦有食積而成者其治法有積有泄赤白濕熱皆有但熱症腹痛瀉急者

凡痢有赤此濕熱傷於脾分從小腸中來也以四物湯加黃連黃芩赤芍相治之

凡痢有白者此濕熱在氣分從大腸中來也以四君子湯加黃連蒼朮治之

凡赤白相雜者此血氣俱傷以八物湯加黃連黃芩

黃柏膏水滑精滑之

以手三指併指即如

凡治痢疾不問赤白但初起之時急為后重服中服

痛者先用三黃丸大承氣湯下之后用香連丸

之調

凡痢赤白日久人事虛防原水經下精盡下之則人

事虛而不可損其不足者不可則積不去而難愈

只用佛和老連服數次快服止痛為度后以香連

丸調之

凡治痢不可妄用也草率非只用三黃丸穩當

凡痢有鮮血者用清血丸以平前草陳米煎湯送下

凡痢有白涎久不止者用固腸丸以陳米飲送下

凡暑月痢純血者以益元散炒過滑石加紅曲為丸

陳米飲送下

凡赤白痢脫肛者此氣下陷也宜升提之和中丸以

升麻湯吞之

凡赤白痢嘔吐不食者此名禁口痢用木香則失之

溫用山藥則失之閉只以參苓白朮散加石膏薑

末陳米飲調下胸次一閉自然思食

凡痢止后身熱不退或人事衰弱者只用集玉丸

之調

芍藥湯 行血則便膿自愈和氣則后重自除

白芍 二 婦尾 黃連 黃芩 各一 大黃 比 甘草

換即 木香 棗心 各五 右細切作一服水碗

半盞一碗空心服如痛初起重急迫者倍加大黃

加芒硝一升若痛滿氣不宣通者加枳實一升

四物湯

當歸 川芎 白芍 熟地 加 黃連 黃芩

黃柏 水煎溫服

四君子湯 見世加 黃連 黃芩 蒼朮 水煎服

八物湯

見胎加

黃連

黃芩

黃柏

蒼朮

滑石

枳殼

枳實

水煎

空心

溫服

三黃丸

黃連

黃芩

大黃

各等

分為末

神曲

糊丸

香枳

即湯送下

大承氣湯

此通陽去積之藥

枳殼

厚朴

大黃

芒硝

甘草

加枳

即水

煎服

保和丸

凡食積脾胃虛者用此藥

山查肉一两 神曲炒 半夏 白朮 陳皮 萊菔子

連喬各五 麥芽炒 一斗五 共為末蒸餅和丸

如粟米大米飲送下

清血丸

槐子炒 荆芥穗 枳壳炒 側柏葉醋炒 各等分為

末醋糊丸陳米湯送下

回腸丸 即二根丸

紅椿木根白皮 白椿木根白皮 各等分為末

米糊丸陳米飲送下

清六丸 即益元散加紅曲是也血痢者此方主之

滑石 一兩 甘草 二錢 紅曲 五錢 炒 為末米糊丸 陳

米湯送下

和中丸

黃連 炒 陳皮 各五錢 澤瀉 車前子 白朮 山藥

白朮 木香 石蓮肉 肉豆蔻 麵包 乾姜 炒

人參 各二錢 共為末醋糊丸 陳米飲送下 如鹿胎者

升麻湯送下

參苓白朮散 此藥性平補助脾胃之藥也

人參

白朮

白茯苓

山藥

白扁豆

炒

其車

桔梗

薏仁

石蓮肉

各一兩

加石蒿

薄

乃

共為末陳米湯化服

症得治痢不問赤白只用保和丸香連丸調之

凡痢久大熱大渴不退者不治

凡痢日久六脉洪數面赤身熱者不治

凡痢日久作渴不止者不治

凡痢日久嘔吐不食服藥無効者不治

凡痢日久不止下紫血成塊者不治

凡痢日久下膿水如屋漏塵水者不治

凡痢日久大肉瘦削折者不治

凡痢久脫肛出寸餘者不治

凡痢久轉作驚搐者不治

凡痢變作泄瀉飲食如常者易治

西江月

痢疾古名滯下食積濕熱相參腸鳴腹痛不能安寢  
急后重无適赤乃小腸火盛白自大腸邪傳愚醫  
以白作寒看辛熱亂行无散

治痢无過二法河間秘訣瀉傳行氣和血術中仙  
取十全无變氣行後重自止血和下痢白痢寒涼  
淡滲禁辛甘不怕年深日遠

九痢先行通藥黃連枳壳味多加酒蒸以大黃或用  
三黃推湯若是虛人忌此且從消導推詳保和丸  
子是仙方只要認病停當

下后痛除乘急丹將赤白消詳赤痢无過剪紅方白  
痢同腸穗當赤白相兼不愈香連九子高強州精  
卿郡把名揚奪取錦纏頭上

若遇時行痢疾排門一樣无差頭疼身痛慢吁痰咳  
一病氣行須怕先用人參敗毒次將承氣推車然後  
察腫脅臑加虛寒分明調他

痢久前法不止氣陷腸滑氣作急將赤藥與櫻升固  
流涎行甚穩參朮升麻歸芍烏梅罌粟連苓乾姜  
柯子赤茯苓粳米陳皮作引

記得痢症藥品解毒接子苓連大黃芒硝可推陳木  
香青皮痛定梅加枳壳后重升麻紫胡櫻升固腸  
粟壳柯梅夏澤泄米苓水順

痢疾不治數症勝若洪大濇防禁口不食吐水漿大  
熱煩渴腹脹大孔不收氣力羸和壓鼻爪穰面紅  
唇赤陷眉墮氣急悶亂死樣

小兒肛頭脫出此由泄痢瀉沉氣虛下陷不能并冷  
熱不和相併羸急后重難使用力太過傷神以致  
肛出冷寒乘不得收返而健

吳穢脫肛症治養血和氣為宜川芎白芷與當歸白  
芍人參赤石棗子山藥蓮肉龍骨五倍相隨細研  
五倍九子兒仍用米湯吞吃

內服湯丸取効外用醋藥扶持梁上倒掛壁壘灰生  
頭燒灰研細鼠糞共末艾摻入桶用火燃之人坐  
其上令燻宜頃刻即收入

煎法若还不効因採取搗為泥朴硝大黃共和之越  
膏敷上即愈不効再用搽藥熊胆水片堪題賜胆  
調搽病即除此法匠人牢記

導乳麥連共木香 大黃婦芎麝枳即  
痢下膿血時无度 昏取一服即安康

治脫肛浴法 用陳艾煎水以陳壁土研細入艾水

廣濟堂

卷

澄過渣以艾水溫浴之俟收入為度外用

熨法 用麥麵以好米醋和成薄餅敷在臍上將艾

薄鋪于餅上燃之